

## اطلاعات در مورد واکسن کورونا

### ویروس کورونا

ویروس کورونا (SARS-CoV-2) از انسان به انسان انتقال می‌یابد و موجب بیماری کووید-19 می‌گردد.

همه مردم در هر سنی ممکن است به این بیماری کورونا مبتلا شوند.

این بیماری از چندین روز تا چندین هفته طول کشیده و موجب ناراحتی‌های مانند تب، سرفه، از دست رفتن حس بویایی و چشایی و تنگی نفس می‌شود. در حالت شدید آن، این بیماری موجب التهاب مجاری تنفسی و دیگر اعضای بدن می‌شود که ممکن است برای مداوا، نیاز به بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه باشد. بیماری کورونا ممکن است عواقب درازمدت داشته و حتی منجر به مرگ شود. واکسیناسیون بهترین روش جلوگیری از بیماری کورونا می‌باشد.

### چرا شما بایستی واکسن بزنید؟

واکسن از ابتلای شما به حالت شدید بیماری کووید-19 جلوگیری می‌کند.

### واکسن چگونه موثر می‌باشد؟

واکسن بدن شما را به تولید پادتن تحریک می‌کند. در صورتی که شما در تماس با ویروس کووید-19 (SARS-CoV-2) قرار بگیرید، این پادتن‌ها مانع از ابتلای شما به نوع شدید بیماری می‌شوند. واکسن حداقل شش ماه از ابتلای شما جلوگیری می‌کند. اگر در موارد استثنایی، شما با وجود واکسیناسیون به بیماری کووید-19 مبتلا شوید، روند بیماری بسیار خفیف بوده و از عوارض مضاعف و مرگ پیشگیری می‌شود.

واکسن‌ها خود حاوی ویروس (SARS-CoV-2) نبوده و لذا امکان ندارد که شما به خاطر زدن واکسن به کووید-19 مبتلا شوید.

### آیا زدن واکسن مطمئن است؟

بله. این مورد آزمایش و تایید قرار گرفته است: مواد واکسن موثر و مطمئن می‌باشند. تمامی واکسن‌های کووید-19 که در اروپا دارای مجوز می‌باشند، به صورت فراگیر آزمایش شده‌اند و مرتباً تحت کنترل شدید می‌باشند. اداره داروی اروپا (Europäische Arzneimittelbehörde EMA) به همین دلیل مجوز برای واکسن‌ها صادر کرده است.

### چه کسی می‌تواند واکسن زده شود؟

زدن واکسن بسته به نوع آن برای اشخاص از سن بالای 12 سال و یا 18 سال ممکن می‌باشد.

همچنین اشخاصی که مبتلا به **پیش‌بیماری** (مانند مرض قند، فشار خون، بیماری‌های قلبی، آسم) می‌باشند، می‌توانند واکسن زده شوند. شما می‌توانید از پیش با پزشک خود در مورد واکسیناسیون مشورت کرده و تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید واکسن زده شوید.

همچنین اشخاصی که دچار **حساسیت** (مانند حساسیت به مواد غذایی، حساسیت به گرده‌ی درختان و یا گرد و خاک، ناسازگاری یا آنتی‌بیوتیک‌ها) می‌باشند، می‌توانند واکسن زده شوند، چون این واکسن‌ها حاوی این مواد نمی‌باشند. لطفاً در حین گفتگوی توجیهی خود، به پزشک بگویید که حساسیت دارید و کارت حساسیت خود را به همراه داشته باشید.

### چه کسانی نیاید واکسن زده شوند؟

اگر شما در حال حاضر مبتلا به یک بیماری عفونی شدید با دمای بالای بدن (بالای 38 درجه) می‌باشید، لطفاً با پزشک خود قبل از زدن واکسن مشورت کنید.

اگر شما باردار بوده و یا فکر می‌کنید که باردار هستید و یا تصمیم به بارداری دارید، لطفاً با پزشک خود مشورت کنید.

اگر شما در حال حاضر به بیماری کووید-19 مبتلا می‌باشید (تا 4 هفته پس از اولین آزمایش مثبت PCR)

## آیا کسانی که قبلاً مبتلا به بیماری کووید-19 بوده اند، بایستی واکسن زده شوند؟

پس از ابتلا به بیماری کووید-19، شما ممکن است دوباره مبتلا شوید. بنابراین بهتر است که کسانی که قبلاً بیماری کووید-19 داشته اند، واکسن زده شوند.

بهتر است که زدن واکسن حداقل 4 هفته پس از بیماری انجام بگیرد.

### کجا و چگونه می‌توانم واکسن زده شوم؟

واکسیناسیون در محل‌های مختلف انجام می‌گیرد. شما می‌توانید با تعیین وقت قبلی و یا بدون وقت قبلی به یکی از مراکز واکسیناسیون مراجعه کنید. برای فهرست به روز نشانی و ساعات کار مراکز رجوع کنید به: [impfservice.wien](http://impfservice.wien)

### زدن واکسن به چه صورت انجام می‌گیرد؟

زدن واکسن داوطلبانه می‌باشد. شما برای زدن واکسن نباید هزینه‌ای پرداخت کنید. قبل از زدن واکسن، به شما یک پرسشنامه (Aufklärungsbogen) داده می‌شود که شما باید پر کنید. اگر سوالاتی در مورد واکسن دارید، می‌توانید قبل از زدن واکسن با پزشک مطرح کنید.

لطفاً در وقت واکسیناسیون، کارت بیمه خود e-Card (اگر دارید) و دفترچه واکسن خود را (اگر دارید) به همراه داشته باشید. کودکان زیر 14 سال لطفاً به همراه یکی از والدین خود و یا با موافقتنامه کتبی امضا شده از طرف یکی از والدین خود مراجعه کنند.

زدن واکسن از طریق تزریق به بازوی شما انجام می‌گیرد. آمپول حاوی ماده واکسن می‌باشد. پس از زدن واکسن، شما باید تقریباً 20 دقیقه در محل بمانید. اگر پس از تزریق واکسن، احساس کسالت می‌کنید، لطفاً به پزشک و یا پرستاران مرکز بگویید.

واکسن‌های مختلفی موجود می‌باشند. بسته به نوع واکسن، به شما تا دو بار واکسن زده می‌شود. واکسن دوم ظرف چند هفته پس از واکسن اول تزریق می‌شود.

### آیا من می‌توانم نوع واکسن را انتخاب کنم؟

بستگی به سن و موجود بودن واکسن شما می‌تواند نوع واکسن را انتخاب کنید.

### آیا واکسن کووید-19 عوارض جانبی دارد؟

واکسن ممکن است که عوارض جانبی ناخوشایندی داشته باشد که به آسانی و خوب قابل درمان می‌باشند، از جمله درد، تورم و یا التهاب در محل تزریق. در بسیار اوقات، اشخاص پس از زدن واکسن احساس خستگی کرده و یا به عنوان مثال سردرد گرفته و یا تب خفیف می‌کنند. همچنین ممکن است حالت تهوع، استفراغ و یا لرز پیش بیاید.

این عوارض جانبی اما واکنشی معمولی نسبت به واکسن می‌باشند، زیرا بدن خود را برای مقابله با عامل بیماری آماده می‌کند. اکثراً این عوارض جانبی بعد از چند روز برطرف می‌شوند. از هر ده نفر که واکسن زده می‌شوند، بیش از یک نفر عوارض جانبی نشان می‌دهند.

### آیا باید با وجود واکسیناسیون همچنان از ماسک FFP2 استفاده کنم؟

با وجود واکسیناسیون باید همچنان مقررات ایمنی مانند پوشش دهان و بینی / ماسک FFP2، فاصله از دیگران و دستورات بهداشتی را رعایت کنید.

### اطلاعات بیشتر:

<https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Haeufig-gestellte-Fragen.html>

<https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Informationen-in-Fremdsprachen-.html>

<https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Jetzt-anmelden-/Faktencheck-zur-Corona-Schutzimpfung.html>

