

AKTUELLE DRUG CHECKING ERGEBNISSE Dezember 2024 (1/3)

In Vorarlberg wurden im Dezember 12 Proben analysiert. Die Ergebnisse können folgend zusammengefasst werden:

- ▶ Von den **acht Kokain Proben** die zur Analyse gebracht wurden, waren fünf Proben mit über 80 % Wirkstoffgehalt extrem hoch dosiert, eine Probe mit über 40 % Wirkstoffgehalt hoch dosiert. In einer Probe wurde zusätzlich Koffein und Procain detektiert. Eine Probe, in der Methamphetamin als Streckstoff vermutet wurde, enthielt keinen pharmakologisch relevanten Wirkstoff.
- ▶ Zwischen den **zwei LSD Proben** wurde ein sehr hoher Unterschied im Wirkstoffgehalt festgestellt.

Wenn du dich trotz dieser aktuellen Ergebnisse zum Konsum gefährlicher Substanzen entscheidest, beachte die folgend angeführten Gefahrenhinweise, die ohne Gewähr zur Verfügung gestellt werden:

Als **Kokain** zur Analyse gebracht

Tatsächliche Inhaltsstoffe:

- Kokain 899 mg/g (=89,9 % Wirkstoffgehalt)*
- Kokain 843mg/g (=84,3 % Wirkstoffgehalt)*
- Kokain 822 mg/g (=82,2 % Wirkstoffgehalt)*
- Kokain 804 mg/g (=80,4 % Wirkstoffgehalt)*
- Kokain 803 mg/g (=80,3 % Wirkstoffgehalt)*
- Kokain 436 mg/g (=43,6 % Wirkstoffgehalt)*
- Kokain 167 mg/g (=16,7 % Wirkstoffgehalt) ,
Koffein 145 mg/g (14,5% Wirkstoffgehalt), Procain
- Kokain (**Kein Wirkstoff nachgewiesen**)

*Achtung hochdosiert! Ab 400 mg/g = 40% Wirkstoffgehalt gilt die Substanz als hochdosiert. Der Grenzwert beruht auf den durchschnittlich am Markt üblichen Dosierungen!

Kokain verursacht ein euphorisches Gefühl, das von gesteigerter Aufmerksamkeit, Unruhe, Erregung und dem Drang nach Bewegung begleitet wird. Gedanken beginnen zu rasen, Konsument*innen reden viel und schnell, häufig schweifen sie ab und produzieren unzusammenhängende Äußerungen. Gesteigerte Selbstsicherheit kann in Leichtfertigkeit und Selbstüberschätzung übergehen. Häufiger Konsum kann rasch zu starker psychischer Abhängigkeit führen. Kokain unterdrückt Hunger, Durst und Müdigkeit. Hohen Dosierungen können Angst

AKTUELLE DRUG CHECKING ERGEBNISSE

Dezember 2024 (2/3)

und Wahnzustände auslösen. Auf körperlicher Ebene können Muskelkrämpfe oder -zittern, Herzrasen, Herzrhythmusstörungen, Blutdruckprobleme und eine Zunahme der Atemfrequenz auftreten. In extremen Fällen kann Kokainkonsum zum Herzstillstand führen. Beim Runterkommen von Kokain wird der euphorische Zustand häufig von depressiven Verstimmungen, Gereiztheit, Angstgefühlen und dem Wunsch mehr zu konsumieren abgelöst. Quelle: www.checkit.wien [02.06.2024]

Procain ist ein Lokalanästhetikum, welches in der Humanmedizin mittlerweile kaum mehr eingesetzt wird. Quelle: checkit.wien [31.12.2023]


Koffein zählt zu der Gruppe der Stimulanzien und wirkt in geringen Dosen aktivierend auf Muskel- und Herztätigkeit und kann die Konzentrationsfähigkeit kurzfristig verbessern. Koffein führt zu einem leichten Anstieg des Blutdruckes und der Körpertemperatur. Nach dem Konsum großer Mengen Koffein (ab 400mg) sind folgende Wirkungen wahrscheinlich: Kopfschmerzen, Schweißausbrüchen, Zittern, Kurzatmigkeit, Nervosität, Herzrasen oder Schlafstörungen. In Kombination mit Speed kann es zu einer starken Belastung des Herz-Kreislaufsystems kommen. Da Koffein die Körpertemperatur erhöht und harntreibende Eigenschaften besitzt, erhöht der Mischkonsum mit Speed die Gefahren von Überhitzung und großem Flüssigkeitsverlust. Quelle: www.checkit.wien [29.08.2023]

AKTUELLE DRUG CHECKING ERGEBNISSE

Dezember 2024 (3/3)

Als **LSD** zur Analyse gebracht

- LSD Blotter



Substanzdetails: **133 µg/Blotter Wirkstoffgehalt**
Farbe Vorderseite: **bunt**
Farbe Rückseite: **beige**

- LSD Blotter



Substanzdetails: **52 µg/Blotter Wirkstoffgehalt**
Farbe Vorderseite: **beige, Logo: Sonne**
Farbe Rückseite: **beige**

*Über 150 µg LSD können zu viel sein. Hohe Dosen erhöhen das Risiko auch für erfahrene Konsument*innen. Es können höchst intensive psychedelische Erlebnisse hervorgerufen werden, welche verstörend und angsteinflößend sein können. Auch paranoide Vorstellungen können vorkommen. Des Weiteren kann eine sogenannte Übersensibilität auftreten. Musik, Licht und andere Reize können dabei als extrem unangenehm empfunden werden. Auch eine Körper-Geist-Trennung kann auftreten. Quelle: www.saferparty.ch [17.10.2023]

Bei der Dosierung auf saugfähigem Papier („Blotter“) wird die Lösung meist auf einzelne quadratische Papierabschnitte getropft. Hier kann es passieren, dass die Verteilung des Wirkstoffes auf den einzelnen Blotter unterschiedlich sein kann. Somit kann es je nach Blotter zu Falsch- bzw. Überdosierungen kommen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Abweichung in vielen Fällen (extrem) groß ist, weshalb wir auf die folgende Information verweisen: <https://checkit.wien/falsche-dosisangaben-bei-isd-trips-ergebnisse-einer-befragung/>